

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
-----------------------	----------------	--------------------------------	-------------	-----------	--------	-----	------------------------------	---------	----------

### I- Demandes d'homologation

E11-8-011	AG COPP 75	75% cuivre métal sous forme d'oxyde cuivreux	WP	Fongicide	Arbres fruitiers: Monilioses: 333 g/hl	15j	C	PROTECO	Homologation
					Arbres fruitiers: Cloque du pêcher: 333 g/hl	15j			
					Arbres fruitiers: Tavelure : 333 g /hl	15j			
					Arbres fruitiers à pépins: Bactérioses: 333 g/hl	15j			
					Arbres fruitiers à noyaux : Bactérioses:167 g /hl				
					Olivier: Œil de paon: 333 g/hl	15 j			
					Tomate: Mildiou: 166 g /hl	15j			
					Tomate: Bactérioses: 166 g /hl	15j			
					Vigne: Mildiou: 4 kg / Ha	15j			
					Pomme de terre: Mildiou: 6,66 kg /Ha	15j			
					Pomme de terre: Alternariose: 6,66 kg /Ha	15j			
E11-6-007	AGRIFOS	45,8% Sels mono et di-potassium de l'acide phosphoreux	SL	Fongicide	Pomme de terre : Mildiou : 6 l/ha	Exempté	C	CPCM	Homologation
					Tomate: Mildiou: 500 cc/hl	Exempté			
E11-8-002	AGROIL	78 % Huile minérale blanche	EC	Insecticide	Agrumes: Pou de Californie: 1,5 l/hl	-	C	UNIVERS HORTICOLE	Autorisation de Vente
E12-9-039	BERNA	40% Extrait de pulpe de coco + 38% Extrait de semences de fruits + 8% Extraits soufrés d'origine végétale	LP	Insecticide	Tomate: <i>Tuta absoluta</i> : 300 cc/hl	-	NC	AGRIPHARMA	Autorisation de Vente
E11-8-003	BIONATROL M	45% Huile de Soja	EO végétale	Fongicide	Tomate : Botrytis : 300 cc/hl	Non requis	NC	UNIVERS HORTICOLE	Homologation
				Fongicide	Framboisier : Botrytis : 300 cc/hl				
				Fongicide	Myrtilier : Botrytis : 300 cc/hl				
E11-8-056	BRUMBY 80 EC	80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet Mexyl	EC	Herbicide	Blé tendre : Folle avoine, Phalaris et Ray-grass : 0,75 l/ha : 2-4 feuilles adventices	75	C	CPCM	Homologation
E11-8-066	COACH 48 EC	480 g/l Chlorpyrifos	EC	Insecticide	Agrumes: Pou de Californie: 150 cc/hl	45 j	C	AGRO SPRAY TECHNIC	Homologation

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
E11-7-067	<b>CUPROZIN</b>	50% Cuivre métal (84,5% oxychlorure de cuivre)	WP	Fongicide	Arbres fruitiers: Monilioses: 500 g/hl	15 j	C	AGRIGUARD	<b>Homologation</b>
					Arbres fruitiers: Cloque du pêcher: 500/hl	15 j			
					Arbres fruitiers: Tavelure: 500 g/hl	15 j			
					Arbres fruitiers: Traitement d'hiver: 1 kg/hl	-			
					Vigne: Mildiou: 500 g/hl	15 j			
					Tomate: Mildiou: 500 g/hl	15 j			
					Tomate: Alternariose: 500 g/hl	15 j			
					Tomate: Bactérioses: 500 g/hl	15 j			
					Pomme de terre: Mildiou: 500g/hl	15 j			
					Pomme de terre: Alternariose: 500 g/hl	15 j			
					Olivier: Œil de paon: 500 g/hl	15 j			
Agrumes: Pourriture brune (Phytophthora spp): 500 g/hl	15 j								
E117012	<b>CURENOX 50 BLEU WG</b>	50% Cuivre métal (oxychlorure de cuivre)	WG	Fongicide	Pêcher: Cloque du pêcher: 500 g/hl	15 j	C	SOPHYTONORD	<b>Homologation</b>
E11-7-021	<b>CYPERCAL</b>	250 g/l Cyperméthrine	EC	Insecticide	Pommier: Pucerons: 20 cc/hl	14 j		PROTECTAGRI	<b>Autorisation de Vente</b>
E11-6-040	<b>DOMINO 720 SC</b>	720 g/l Chlorothalonil	SC	Fongicide	Tomate : Mildiou : 200 cc/hl	7 j	C	CPCM	<b>Autorisation de Vente</b>
E12-9-036	<b>EMA+LUF 50 WG</b>	10 % Emamectin Benzoate + 40 % Lufenuron	WG	Insecticide	Tomate: <i>Tuta absoluta</i> : 0,15 kg/ha	7 j	A	SYNGENTA MAROC	<b>Autorisation de Vente</b>
E12-9-037	<b>ERADICOAT</b>	270 g/L de Maltodextrin	SL	Insecticide	Tomate: Acariens: 1,6 l/hl	-	C	SAOAS	<b>Autorisation de Vente</b>
					Fraisier: Acariens: 1,6 l/hl	-			
E11-7-034	<b>FRUPICA 50 WP</b>	50% Mepanipyrime	WP	Fongicide	Tomate: Botrytis: 0,8 kg/ha	3 j	C	AMAROC	<b>Autorisation de Vente</b>
					Fraisier: Botrytis : 0,8 kg/ha	3 j			
E11-7-051	<b>GLYWEED</b>	360 g/l Glyphosate	SL	Herbicide	Agrumes: Dicotylédones et annuelles vivaces: 6 l/ha: bon état de végétation des adventices		C	PROTECO	<b>Homologation</b>
E11-8-033	<b>HERBADOXAQ UA</b>	455 g/l Pendiméthaline	CS	Herbicide	Maïs: Dicotylédones et graminées: 2,6 l/ha: pré semis		C	BASF	<b>Homologation</b>
E118069	<b>HORMA</b>	275 g/l 2,4 D + 275 g/l 2,4-MCPA	SL	Herbicide	Blé tendre : Dicotylédones : 1 l/ha : Plein tallage à fin tallage de la céréale		C	AGREVA	<b>Autorisation de Vente</b>

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
E11-7-015	JACKPOT 50 g/l EC	50 g/l Lambda-cyhalothrine	EC	Insecticide	Olivier: Psylle: 20 cc/hl	7 j	C	CPCM	<b>Homologation</b>
					Tomate: Noctuelles: 250 cc/ha	3 j			
					Courgette: Noctuelles: 250 cc/ha	3 j			
					Haricot vert: Pucerons: 25 cc/hl	7 j			
					Betterave à sucre: Casside: 150 cc/ha	7 j			
					Maïs: Sésamie: 250 cc/ha	45 j			
E11-7-065	KEMDOR 21,4 SC	214 g/L Imidacloprid	SC	Insecticide	Agrumes: Mineuse: 50 cc/hl	21 j	C	ARZAK TRADE SEEDS	<b>Autorisation de Vente</b>
					Pommier: Pucerons: 50 cc/hl	14 j			
					Tomate: Mouche blanche: 50 cc/hl	3 j			
					Poivron: Thrips: 50 cc/hl	3 j			
					Poivron: Pucerons: 50 cc/hl	3 j			
					Haricot vert: Thrips: 50 cc/hl	3 j			
E11-5-002	LEPRINCE	360 g/l Glyphosate	SL	Herbicide	Agrumes: chiendent : 6 l/ha, état poussant de végétation des adventices	C	SAOAS	<b>Homologation</b>	
					Jachère : Jujubier 3 l/ha : stade drupe verte				
					Rosaces à noyau (Pêcher): Annuelles et Vivaces : 6 l/ha, état poussant de végétation des adventices				
E11-7-043	MEGABAN	480 g/l Chlorpyrifos	EC	Insecticide	Agrumes: Pou de Californie: 150 cc/hl	45 j	A	ACI EQUIPMENT	<b>Homologation</b>
					Tomate: Noctuelles: 150 cc/hl	21 j			
E11-8-051	METEOR	15,7 g/l Deltaméthrine	SC	Insecticide	Tomate: Noctuelles: 50 cc/hl	3 j	A	EZZOUHOUR	<b>Homologation</b>
					Courgette: Pucerons: 50 cc/hl	3 j			
					Haricot vert: Thrips: 50 cc/hl	3 j			
E11-6-045	MIDAS 98:2	98% Iodométhane + 2% Chloropicrine	Fum	Désinfection du sol	Tomate: Nématodes à galles: 20 g/m <sup>2</sup>	7 à 14 j	A	AMAROC	<b>Autorisation de Vente</b>
					Haricot vert: Nématodes à galles: 25 g/m <sup>2</sup>	7 à 14 j			

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
E11-7-040	<b>NATIVO 300 SC</b>	100 g/l Trifloxystrobine + 200 g/l Tébuconazole	SC	Fongicide	Blés: Rouille: 1 l/ha	35 j	C	BAYER SA	<b>Homologation</b>
E11-6-010	<b>ORSALIS 5% SC</b>	50 g/l Hexaconazole	SC	Fongicide	Tomate : Oïdium : 50 cc/hl	15 j	C	ARZAK SEEDS TRADE	<b>Autorisation de Vente</b>
					Courgette : Oïdium : 50 cc/hl	3 j			
					Melon : Oïdium : 40 cc/hl	10 j			
					Vigne : Oïdium : 30 cc/hl	30 j			
E11-8-009	<b>OXI – CUP WG</b>	50% Cuivre métal (87% Oxychlorure de cuivre)	WG	Fongicide	Tomate: Mildiou: 500 g/hl	15 j	C	PHILEA	<b>Homologation</b>
E11-8-050	<b>OXICRON</b>	50% Cuivre métal (85% Oxychlorure de cuivre)	WP	Fongicide	Arbres fruitiers: Monilioses: 500g/hl	15 j	C	UNIVERS HORTICOLE	<b>Homologation</b>
					Arbres fruitiers: Cloque du pêcher: 500 g/hl	15 j			
					Arbres fruitiers: Traitement d'hiver: 1 kg/hl	-			
					Vigne: Mildiou: 500 g/hl	15 j			
					Tomate: Mildiou: 500 g/hl	15 j			
					Tomate: Alternariose : 500 g/hl	15 j			
					Tomate: Bactérioses: 500 g/hl	15 j			
					Pomme de terre: Mildiou: 500 g/hl	15 j			
					Pomme de terre: Alternariose: 500 g/hl	15 j			
					Olivier: Œil de paon: 500 g/hl	15 j			
					Agrumes: Pourriture brune: 500 g/hl	15 j			
E11-8-042	<b>PRIORI OPTI</b>	80 g/l Azoxystrobine +	SC	Fongicide	Tomate : Cladosporiose : 2 l/ha	3 j	C	SYNGENTA	<b>Homologation</b>

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
		400 g/l Chlorothalonil			Melon : Mildiou : 2 l/ha	14 j			
E12-9-037	<b>RADIANT 120 SC</b>	120 g/l Spinetoram	SC	Insecticide	Tomate: <i>Tuta absoluta</i> : 25 cc/hl	3 j	C	PROMAGRI	<b>Autorisation de Vente</b>
E11-7-047	<b>RAVANE 50</b>	50 g/l Lambda-cyhalothrine	EC	Insecticide	Betterave à sucre: Casside: 150 cc/ha	7 j	C	SOPROCHIBA	<b>Autorisation de Vente</b>
E11-6-041	<b>REMEDIER</b>	2% <i>Trichoderma harzianum</i> Rifai souche ICC 012 + 2% <i>Trichoderma vindePers</i> ex Gray souche ICC 080	WP	Fongicide	Melon: Phytophthora spp: 2,5 kg/ha	Non requis	C	MARBAR CHIMIE	<b>Homologation</b>
				Tomate: Phytophthora spp: 2,5 kg/ha	Non requis				
E117064	<b>ROVRAL 500 SC</b>	500 g/l Iprodione	SC	Fongicide	Pêcher: Moniliose: 150 cc/hl	3 j	C	BAYER SA	<b>Homologation</b>
				Tomate: Botrytis: 100 cc/hl	3 j				
				Fraisier: Botrytis: 100 cc/hl	3 j				
E11-8-018	<b>RUBAH</b>	80 g/l Clodianafof Propargyl + 20 g/l Cloquintocet Mexyl	EC	Herbicide	Blé tendre: Folle avoine, Phalaris et Ray-grass : 0,75 L/ha: 2-4 feuilles adventives	75	C	UNIVERS HORTICOLE	<b>Homologation</b>
E11-8-030	<b>SULFOSPRAY</b>	80% Soufre	WP	Fongicide	Arbres fruitiers: Oïdium : 500 g/hl (à l'exception des abricotiers pour les conserves)	5 j	C	AGRO SPRAY TECHNIC	<b>Homologation</b>
				Vigne : Excoriose : 500 g/hl	5 j				
				Vigne : Oïdium : 500 g/hl	5 j				
				Cultures maraîchères : Oïdium : 500 g/hl	5 j				
				Cultures maraîchères: Acariose: 500 g/hl	5 j				
				Cucurbitacées: Oïdium : 500 g/hl	5 j				
				Cultures ornementales: Oïdium : 500 g/hl	5 j				
E11-6-030	<b>SWING GOLD</b>	50 g/l Epoxiconazole + 133 g/l Dimoxystrobine	SC	Fongicide	Blés : Septoriose : 1 l/ha	35 j	C	BASF MAROC	<b>Autorisation de Vente</b>
E11-7-042	<b>TITAN</b>	50 g/l Hexaconazole	EC	Fongicide	Tomate: Oïdium: 50 cc/hl	15 j	C	ACI EQUIPMENTS	<b>Autorisation de Vente</b>

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
E11-8-020	<b>VERTIGO 018 EC</b>	18 g/l Abamectine	EC	Insecticide	Haricot vert: Acariens: 75 cc/hl Courgette: Pucerons: 50 cc/hl	7 j 3 j	A	PROTECO	<b>Autorisation de Vente</b>

## II- Demandes de Réhomologation

E07-6-004	<b>BEAM 75 WP</b>	75% Tricyclazole	PM	Fongicide	Riz : Pyriculariose : 0,3 kg/ha	15 j	C	PROMAGRI	<b>Homologation</b>
B07-5-004	<b>CONCORD 100 EC</b>	100 g/l Alpha-cyperméthrine	EC	Insecticide	Tomate: Noctuelles: 12,5 cc/hl	3 j	C	BASF MAROC	<b>Homologation</b>
					Betterave à sucre: Casside: 150 cc/ha	21 j			
D01-1-003	<b>COVAXM</b>	13% Cuivre métal + 30% Manèbe	WP	Fongicide	Pomme de terre: Alternariose : 2 à 2,5 kg/ha	15 j	C	SOPROCHIBA	<b>Prorogation de l'Autorisation de Vente</b>
					Pomme de terre: Mildiou: 2 à 2,5 kg/ha	15 j			
					Tomate : Mildiou 250 à 300 g/hl	15 j			
					Vigne: Mildiou: 300 à 350 g/hl	28 j			
					Pommier: Tavelure: 350 g/hl	-			
E070-4-003	<b>FRUITFOGP</b>	25% Orthophénylphénol	FD	Fongicide	Traitement fumigène désinfectant des chambres vides pour contrôle des pourritures causées par: <i>Penicillium</i> spp et autres champignons lors de l'occupation ultérieure des locaux des fruits : 300 g/ 500 m <sup>3</sup> d'air à traiter	Non requis	C	SAGRIMA	<b>Homologation</b>

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
D06-6-001	<b>GOAL 2 E</b>	240 g/l Oxy fluorofène	EC	Herbicide	Oignon: Dicotylédones et Graminées annuelles (sensibles): <b>1,5 l/ha</b> : en pré ou post émergence des mauvaises herbes (3 à 4 feuilles vraies des mauvaises herbes) : Après le repiquage (10 à 12 j), une seule application	60	C	AGRIMATCO	<b>Prorogation de l'Autorisation de Ventes</b>
					Canne à sucre: Dicotylédones et Graminées annuelles (sensibles) : <b>3 l/ha</b> : en pré émergence de la culture et des mauvaises herbes (3 à 4 feuilles vraies des mauvaises herbes) : Au moment du bouturage, Une seule application	-			
E01-6-004	<b>LUMAX 5375 SE</b>	375 g/l Smetolachlor + 375 g/l Mesotrione + 125 g/l Terbutylazine	SE	Herbicide	Maïs: Graminées et Dicotylédones (sauf <i>Convolvulus arvensis</i> ) : <b>4 l/ha</b> : pré ou post levée précoce du maïs.	-	C	SYNGENTA	<b>Homologation</b>
					Canne à sucre: Dicotylédones et Graminées annuelles: <b>4 l/ha</b> : pré émergence de la culture (3 à 4 feuilles de la canne à sucre)	-			
B11-6-002	<b>OLYMP 10 EW</b>	100 g/l Flusilazole	EW	Fongicide	Vigne: Oïdium: <b>100 cc/hl</b> (Avant floraison) ; <b>150 cc/hl</b> (Après floraison)	30 j	C	AGRIMATCO	
					Pommier : Oïdium : <b>30 cc/hl</b>	30 j			
D09-9-003	<b>PROMALIN</b>	2% Gibbérellines (A4-A7) + 2% 6-benzyl adenine	SL	Régulateur de croissance	Pommier: Amélioration du profil du calibre et de l'allongement des fruits (pommes rouges et jaunes) Pomme rouge: <b>125 cc /hl</b> en une seule application, stade floraison Pomme jaune: <b>30 cc /hl</b> en quatre applications (1ère fleur, floraison, chute des pétales, chute des derniers pétales)		C	MARBAR	<b>Homologation</b>
					Poirier: Amélioration du calibre des fruits et prévention de la rugosité: <b>30 cc /hl</b> : deux applications : au stade 20 à 30% fleurs ouvertes et au stade 80% fleurs ouvertes	-			
E02-7-006	<b>REVIVO</b>	70% Métribuzine	WG	Herbicide	Pomme de terre: dicotylédones et graminées annuelles : <b>1 kg/ha</b> : une seule application, après le buttage et avant la levée complète de la culture (moins de 20% des pieds émergés)		C	SOPROCHIBA	<b>Homologation</b>
E02-1-001	<b>RUGBY 200 CS</b>	200 g/l Cadusafos	CS	Nématicide	Tomate: <b>20 l/ha</b> (7 à 10 j avant transplantation) et <b>10 l/ha</b> (juste après la 1ère récolte soit 80 j après la 1ère application)	3 j	A	BASF MAROC	<b>Homologation</b>
					Banancier: <b>10 cc/plant</b>	3 j			
E07-0-4005	<b>SANAZOLE 250 EC</b>	250 g/l Propiconazole	EC	Fongicide	Blés : Septoriose : <b>0,7 l/ha</b>	40 j	C	PROMAGRI	<b>Homologation</b>

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
					Blés : Rouille brune : 0,7 l/ha				
D02-4-001	<b>SUPERMETHRINE 10</b>	100 g/l Cyperméthrine	EC	Insecticide	Tomate: Noctuelles: 60 g/hl	3 j	C	CPCM	<b>Homologation</b>

### III- Demandes d'Extension d'Usage

E10-2406	BAROQUE 10 SC	100 g/l Etoxazole	SC	Acaricide	Nectarine: Acarien rouge: 25 cc/hl	-	C	AGRIMATCO	Extension accordée
					Pêcher: Acarien rouge: 25 cc/hl	14 j			
B07-5-004	CONCORD 100 EC	100 g/l Alpha-cyperméthrine	EC	Insecticide	Betterave à sucre: Cléone: 150 cc/hl	-	C	BASF MAROC	Extension accordée
E12-7-004	CONFIDOR 200 OD	200 g/l Imidaclopride	OD	Insecticide	Tomate: <i>Tuta absoluta</i> : 0,75 L/ha	-	C	BAYER SA	Extension accordée
E12-9-007	SPARTAN	500 g/l Polyoxyéthylène d'amine grasse	EC	Adjuvant-Mouillant	Mouillant pour bouillies herbicides 100 cc/hl	-	C	SAOAS	Extension accordée
					Mouillant pour bouillies régulateurs de croissance 100 cc/hl	-			
D119003	TRACER 480 SC	480g/l Spinosad	SC	Insecticide	Haricot vert: Thrips: 200 cc/ha	3 J	C	PROMAGRI	Extension accordée
D02-4-004	VERTIMEC	18g/l Abamectine	EC	Insecticide	Pêcher et nectarine: Thrips : 75 cc/hl	14 j	A	SYNGENTA MAROC	Extension accordée
					Nectarinier: Thrips : 75 cc/hl	14 j			Extension accordée