

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DES EAUX ET FORETS

COMITE NATIONAL DE LA SELECTION
DES SEMENCES ET DES PLANTS

DIRECTION DE LA PROTECTION DES
VEGETAUX DES CONTROLES TECHNIQUES
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DE CONTROLE DES
SEMENCES ET DES PLANTS

B.P. : 1308 - Rabat - Tél. : 037 77 10 85

DEMANDE D'INSCRIPTION

AU CATALOGUE OFFICIEL

TOMATE

Liste A (1)

B

Espèce:

1- Nom du demandeur :
.....

2- Nom de la variété:
.....

3- Nom de la variété la plus
proche:.....

4- Intérêt de la variété en demande d'inscription :
.....

.....

.....

Variétés témoins cultivées :	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....

5- Recommandations particulières:
.....

.....

.....

.....

(1) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix.

Liste A : variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc

Liste B : variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

CARACTERES MORPHOLOGIQUES
DE LA TOMATE

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
Plante: - Type de croissance - Hauteur - Vigueur	Déterminée	Naine Faible	Moyenne Moyenne	Haute Forte	Indéterminée
Tige: - Type - Longueur des entrenœuds - Nombre de feuilles sous la 1 ^{ère} inflorescence	Raide	Flexible courts	Moyens	Longs	
Feuilles: - Couleur du feuillage - Densité du feuillage - Port - Division du limbe - Type de feuille	Pennée Classique	Vert clair Faible Demi dressé	Vert moyen Moyenne Horizontal	Vert foncé Forte Retombant	Bipennée Pomme de terre
Fleurs: - Inflorescence (2 ^{ème} et 3 ^{ème} cyme) - Fasciation de la 1 ^{ère} fleur - Pilosité du style	Unipare Absente Absente	Bipare	Multipare		Présente Présente
Fruit: - Forme générale (Hauteur sur diamètre) - Forme de la partie pédonculaire - Forme de la section transversale - Couleur avant maturité - Collet - Couleur de l'épiderme à maturité - Couleur de la chair à maturité - Poids (en grammes) - Diamètre - Homogénéité du calibre	Aplati Lisse Ronde Vert clair Nul Blanc Jaune Hétérogène	Légèrement aplati	Arrondi Légèrement côtelée Avec pans Vert franc Peu marqué Rouge	Allongé cylindrique	Allongé pruniforme Côtelée Autre forme Vert foncé Marqué Jaune Cramoisie Homogène

(1) Souligner la description adéquate et mentionner toute particularité

CARACTERES AGRONOMIQUES
TOMATE

CARACTERES	APPRECIATION	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la floraison (1) - Précocité à maturité (début de coloration de l'attache pistillaire) (1) - Rendement total - Rendement commercialisable
*Réactions aux conditions de l'environnement: - Froid - Chaleur - Salinité de l'eau - Salinité du sol *Résistance au transport *Résistance à l'éclatement *Taux de nouaison
*Réactions aux maladies: - Fusarium oxysporum S.P. - Verticillium dahliae - Alternaria solani - Mildiou (Phytophthora infestans) - Mosaïque du tabac - Nématodes
Observations diverses

Groupe de culture (2):

- Tomate d'été
- Tomate industrielle
- Tomate d'automne
- Tomate sous abri

(1) Précocité en nombre de jours depuis le semis

(2) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DES EAUX ET FORETS

COMITE NATIONAL DE LA SELECTION
DES SEMENCES ET DES PLANTS

DIRECTION DE LA PROTECTION DES
VEGETAUX DES CONTROLES TECHNIQUES
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DE CONTROLE DES
SEMENCES ET DES PLANTS

B.P. : 1308 - Rabat - Tél. : 037 77 10 85

DEMANDE D'INSCRIPTION
AU CATALOGUE OFFICIEL

MELON

Liste A (1)
B

1- Nom du demandeur :

2- Nom de la variété:

- 3- Groupe (1) : - Melons sucrins et brodés
- Melons d'hiver
 - Melons cantaloups
 - Melons cantaloup charentais
 - Autre :

4- Nom de la variété la plus proche:.....

5- Intérêt de la variété en demande d'inscription :

.....

.....

Variétés témoins cultivées :	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....

6- Recommandations particulières (saison de culture et autres):

.....

.....

.....

(1) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix.
Liste A : variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc
Liste B : variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

CARACTERES MORPHOLOGIQUES**MELON**

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
Plante: - Vigueur - Type - Longueur des bras - Longueur des entrenoeuds		Faible Peu ramifiée Courts Très courts	Moyenne Ramifiée Moyens Moyens	Forte Très ramifiée Longs Longs	Très longs
Tige: - Pilosité - Epines - Diamètre des rameaux	Absente Absentes Très mince	Faible Faibles Mince	Moyenne Moyennes Moyen	Forte Fortes Gros	Très gros
Feuillage: - Couleur du feuillage - Densité du feuillage - Longueur sur largeur du limbe - Bord du limbe: ondulation - Type de feuille - Dimension des feuilles - Disposition des taches de pigmentation	Vert clair Entière Très petites Non pigmentée	Vert blond Faible Petit Faible Légèrement lobée Petites Sur les nervures	Vert gris Moyenne Moyen Moyenne Moyennement lobée Moyennes Sur les bords et nervures	Vert foncé gris Forte Grand Forte Fortement lobée Grandes Localisées sur le limbe	Vert foncé Très grandes diffuses
Fleurs: - Intensité de la floraison - Fleurs hermaphrodites - Expression du sexe - Fleurs femelles sur fleurs mâles - Importance de la coulure	Absentes Très peu de fleurs femelles 0,25 Nulle ou très faible	Faible Peu présentes Fleurs mâles prédominantes Supérieur à 0,25 Faible	Moyenne Assez nombreuses Environ autant de mâles que de femelles Egal à 1 Moyenne	Forte Nombreuses Fleurs femelles prédominantes Inférieur à 1,25 Forte	Très peu de fleurs mâles Supérieur à 1,25 Très forte
Fruit: - Importance de la fructification (nombre de fruits par plante) - Importance de la parthénocarpié - Forme du fruit - Poids moyen du fruit (en grammes) - Couleur externe - Intensité de la couleur externe - Virement de la couleur à maturité - Surface du fruit - Importance des verrues - Côtes sur fruit - Rayures - Intensité des côtes - Intensité des rayures - Intensité de la brodure - Sillons - Profondeur des sillons - Apex du fruit	Absente Aplati Crème Faible Blanche Lisse Non verruqueux Lisse Absentes Nulle Absents Légèrement aplati	Inférieur à 3 Faible Arrondi Blanc verdâtre Légèrement mouchetée Vert grisâtre Légèrement rugueuse Faiblement verruqueux Fruit ridé courtes Faible Faible Peu brodé Petits Faible Aplati	3 à 5 Moyenne Ovoïde Jaune Moyennement mouchetée Jaune Moyennement rugueuse Moyennement verruqueux Peu de côtes Moyennes Moyenne Moyenne Brodure moyenne Moyens Moyenne Arrondi	6 à 8 Forte Ballon de rugby Jaune orangé Fortement mouchetée Orange Fortement rugueuse Fortement verruqueux Côtes moyennes Longues Forte Forte Brodé Larges Profonde Angulaire	Supérieur à 8 Oblong - elliptique large Vert foncé Homogène intense Rouge - orange Beaucoup de côtes Très brodé

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
- Attache circulaire de l'apex - Base du fruit - Longueur du fruit - Diamètre du fruit - Longueur du pédoncule - Dimension de l'écorce - Couleur de la chair - Saveur de la chair	Absente Creuse	Aplatie Court Petit	Arrondie Moyen Moyen	Angulaire Long Grand	Présente
- Goût	Très court Très mince Verdâtre Sans parfum	Court Mince Blanche Légèrement parfumée	Moyen Moyen Orange Moyennement parfumée	Long Long Gros Rouge - orange Assez parfumée	Très long Très gros Rouge Très parfumée
- Texture de la chair	Très peu sucré ou amer Très peu juteuse	Légèrement sucré Peu juteuse	Moyennement sucré Moyennement juteuse	Assez sucré Juteuse	Très sucré Très juteuse
- Fermeté de la chair - Longueur sur diamètre du fruit - Résistance à la pénétration - Importance des graines dans le fruit	Très molle	Molle Inférieur à 1 Faible Peu de graines	Egal à 1 Moyenne moyenne	Ferme Inférieur à 1,25 Forte Beaucoup de graines	Très ferme Supérieur à 1,25

(1) Souligner la description adéquate et mentionner toute particularité

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERE	APPRECIATION	TEMOIN DE COMPARAISON
- Rendement à l'hectare
- Date de semis
- Précocité à la floraison (2)
- Précocité à la maturité (2)
- Homogénéité de la maturité
- Mode de conduite souhaité
- Résistance à l'éclatement
- Résistance à la fermentation
- Résistance aux maladies:
-Mosaïque du concombre
-Autres mosaïques(du melon, de la pastèque, de la courgette,.....)
-Virus II du concombre (C.G.M.V.)
-Nécroses du melon, du concombre et du tabac
-Criblure du melon
-Flétrissement des cucurbitacées (Erwinia tracheiphila)
-Rhizoctonia violacea et solani
-Oïdium (Erysiphes et Sphaerotheca)
-Cladosporiose
-Grillage des feuilles (corynespora melonis)
-Botrytis
-Fusariose du melon (F.O.F. melonis)
-Verticilliose (V. dahliae et alboatum)

Observations diverses :

(2) Précocité en nombre de jours depuis le semis.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DES EAUX ET FORETS

COMITE NATIONAL DE LA SELECTION
DES SEMENCES ET DES PLANTS

**DEMANDE D'INSCRIPTION
AU CATALOGUE OFFICIEL**

DIRECTION DE LA PROTECTION DES
VEGETAUX DES CONTROLES TECHNIQUES
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DE CONTROLE DES
SEMENCES ET DES PLANTS

LAITUE

Liste A (1)
B

B.P. : 1308 - Rabat - Tél. : 037 77 10 85

Espèce:.....

1- Nom du demandeur :

2- Nom de la variété:

3- Groupe de laitue (1) :

- Laitue pommée
- Laitue Batavia
- Laitue -tige
- Laitue à couper
- Laitue romaine

4- Nom de la variété la plus proche:.....

5- Intérêt de la variété en demande d'inscription :

.....

.....

Variétés témoins cultivées :	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....

6- Recommandations particulières (saison de culture et autres):

.....

.....

.....

(1) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix.

Liste A : variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc

Liste B : variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

CARACTERES MORPHOLOGIQUES**LAITUE**

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
Graine: - Couleur de la graine sèche	Blanche		Jaune		Noire
Plantule: - Pigmentation anthocyanique	Absente				Présente
Pomme: - Pommaison - Intensité de la pommaison - Chevauchement des feuilles - Importance du chevauchement des feuilles - Forme en section longitudinale - Fermeture de la base - Fermeté	Absente Absent Elliptique Très molle	Faible Faible Elliptique large Faible Molle	Moyenne Moyen Arrondie Moyenne Moyenne	Forte Fort Elliptique transverse Forte Ferme	Présente Présent Très ferme
Tige: - Fasciation - Intensité de la fasciation - Détachement des feuilles	Absente Très faible Très facile	Faible Facile	Moyenne	Forte Difficile	Présente Très forte Très difficile
Feuille: - Couleur du limbe au stade 3-4 feuilles - Couleur à la maturité de récolte - Pigmentation anthocyanique - Répartition de l'anthocyane - Type de répartition de l'anthocyane - Brillance de la face supérieure - Profil de la surface des feuilles externes - Cloquère - Texture - Epaisseur de la feuille - Port du sommet de la feuille - Ondulation du bord du limbe - Bord de la partie apicale - Bord de la partie basale	Vert très clair Vert jaunâtre Absente Localisée En taches Nulle ou très faible Nulle ou très faible Très souple Nulle ou très faible Entier Entier	Vert clair Vert clair Sur les bords Faible Concave Faible Souple Mince Retombant Faible Echancré Echancré	Vert moyen Vert moyen Sur les bords et les nervures Moyenne Plat Moyenne Moyenne Moyenne Denté Denté	Vert foncé Vert foncé Vert gris Forte Convexe Forte Croquante Epaisse Erigé Forte	Vert très foncé Vert bleu Présente Sur toute la surface Diffuse Très forte Très forte Très croquante Très forte
Plante: - Diamètre		Petit	Moyen	Grand	

(1) Souligner la description adéquate

Mentionner toute particularité

CARACTERES AGRONOMIQUES
LAITUE

CARACTERE	APPRECIATION	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité de la pomaison (2)
- Précocité à la maturité de récolte (2)
- Homogénéité de végétation
- Poids moyen
- Résistance à l'étiollement dans les conditions de température élevée, journée courte et lumineuse
- Résistance à la montée à graine
- Epoque de début de montaison en jours longs
- Résistance aux maladies:		
- Mildiou (<i>Bremia lactucae</i>)		
- Mosaïque de la laitue		

(1) Cette appréciation peut se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9

1 à 3 niveaux les plus bas du caractère

7 à 9 niveaux les plus élevés du caractère

0 (Zéro) peut être utilisé dans le cas d'absence de renseignement

N.B : Indiquer toute particularité.

(2) Préciser la précocité en nombre de jours depuis le semis

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DES EAUX ET FORETS

COMITE NATIONAL DE LA SELECTION
DES SEMENCES ET DES PLANTS

DIRECTION DE LA PROTECTION DES
VEGETAUX DES CONTROLES TECHNIQUES
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DE CONTROLE DES
SEMENCES ET DES PLANTS

B.P. : 1308 - Rabat - Tél. : 037 77 10 85

DEMANDE D'INSCRIPTION
AU CATALOGUE OFFICIEL

BETTERAVE ROUGE
(Beta vulgaris L. var. esculenta)

—Liste A (1)
B

- 1- Nom du demandeur :
- 2- Nom de la variété:
- 3- Nom de la variété la plus proche:.....
- 4- Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-

Variétés témoins cultivées :	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....

- 5- Recommandations particulières:
-
-
-

(1) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix.
 Liste A : variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc
 Liste B : variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

CARACTERES MORPHOLOGIQUES
BETTERAVE

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
Glomérule: - Nombre de semences par glomérule	Monogerme				Multigerme
Plantule: - Pigmentation anthocyanique		Faible	Moyenne	Forte	
Plante: - Hauteur		Basse	Moyenne	Haute	
Feuille: - Port - Taille du limbe - Couleur principale du limbe - Ondulation du bord du limbe - Cloqûre du limbe - Pigmentation anthocyanique des nervures - Lobes à la base du limbe - Longueur du pétiole - Largeur de la base du pétiole - Couleur du pétiole	Dressé Vert pâle Nulle ou très faible Nulle ou très faible Absents Vert	Petit Vert foncé Faible Faible Faible Court Étroite Orange	Demi-dressé Moyen Rouge vert Moyenne Moyenne Moyenne Moyen Moyenne Orange à rouge	Grand Rouge foncé Forte Forte Forte Long Large Rouge	Horizontal Très forte Très forte Présents Rouge violet
Racine: - Position dans le sol - Forme de la section longitudinale - Forme de la section transversale - Forme de la base - Liège - Couleur externe - Couleur principale de la chair - Couleur des cercles par rapport à la couleur principale de la chair - Fibrosité de la chair après cuisson	Très superficielle Elliptique étroite Obtuse Nul ou très faible Blanche Blanche Plus claire	Superficielle Elliptique transverse Régulière Effilée Faible Jaune Jaune Faible	Moyennement enterrée Circulaire Intermédiaire Moyen Rouge Orangée Identique Moyenne	Enterrée Elliptique large à oblongue Irrégulière Fort Rouge carmin Forte	Très enterrée Obtriangulaire étroite Très fort Violacée Plus foncée

(1) Souligner la description adéquate et mentionner toute particularité.

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERE	APPRECIATION	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la récolte
- Préciser le cycle végétatif du semis à la récolte
en nombre de jours
- Résistance à la montaison
- Nombre de jours du semis à la montaison
- Résistances aux maladies

Autres renseignements:

.....